

DESCRIPTION :

Votre médecin vous a prescrit un test de C. difficile (Clostridium difficile). Ce test sert à détecter la présence de toxine ou gène de toxine causé par la bactérie de C. Difficile qui pourrait être responsable. Le test est simple et rapide à faire. De plus, aucune diète est nécessaire.

À SAVOIR:

Vous ne DEVEZ PAS prendre de médicaments qui pourraient vous aider à aller à la selle (*laxatif, d'anti-diarrhée ou d'antiacide*) pendant les 24h avant de faire la collecte.

La collecte de selles pour ce test doit contenir des SELLES LIQUIDE SEULEMENT (*Aucune substance dure*) car le laboratoire REFUSERA tous les ÉCHANTILLONS qui ne seront pas liquide. De plus, les selles ne DOIVENT PAS être en CONTACT avec l'EAU, avec l'URINE ou le bol de TOILETTE.

PRÉLÈVEMENT :

1. Ouvrir votre trousse. (*sac BIOHAZARD + POT stérile*)
2. Inscrire LISIBLEMENT votre : NOM, Prénom / Date & Heure (*de la collecte*) sur l'étiquette du contenant.
3. Uriner et vider complètement votre vessie. (*Car les selles ne DOIVENT PAS être en CONTACT avec l'EAU, avec l'URINE ou le bol de TOILETTE*).
4. Déféquer dans un contenant (*assiette d'aluminium*). Jeter une fois terminé.
5. À l'aide d'une cuillère de plastique, mettre l'équivalent de 1-2 cuillères à soupe de vos selles dans le POT stérile.
6. Remettre le couvercle sur le contenant et fermer hermétiquement.
7. Remettez le contenant dans le sac BIOHAZARD et refermez celui-ci hermétiquement.
8. Lavez-vous les mains soigneusement.
9. Conserver le sac (*avec le contenant*) dans le réfrigérateur (4°C).

ATTENTION :

Vous devez apporter ou remettre votre échantillon de selles dans les 24h suivant la collecte et assurez-vous d'apporter ou d'avoir votre REQUÊTE et votre RAMQ (*Carte d'Assurance Maladie*), car le laboratoire peut REFUSER tous les prélèvements NON CONFORME aux instructions énumérées ci-haut.

RÉSULTAT en laboratoire : Recherche de C. difficile / environ 24h après réception du spécimen.